



Macroplastique®

BEHANDELING VAN MANNEN
MET STRESSINCONTINENTIE



BETROUWBAAR PRODUCT. BETROUWBARE UITKOMSTEN.

MACROPLASTIQUE® BULKING AGENT

Macroplastique is geïndiceerd voor stressincontinentie die vaak wordt gezien bij mannen na een TURP of een radicale prostatectomie.

- Bewezen veilig en effectief
- Minimaal invasieve procedure
- Direct resultaat

MINIMAAL INVASIEF


- Aanzienlijk minder invasief dan de andere behandelopties
- Geeft onmiddellijk verlichting van symptomen
- Snel herstel, minimale complicaties

BEWEZEN

- Klinisch succesvol sinds 1991
- Gedocumenteerd langdurig succes¹⁻⁷
 - Tot 5 jaar follow-up
 - Tot 80% succes als vastgesteld aan de hand van urineverlies (gewicht van incontinentieverband), afgenomen gebruik van incontinentieverband en beoordeling van de perceptie van de patiënt ten aanzien van de uitkomst van de behandeling


VOORDELIG

Aanzienlijk minder duur dan huidige andere behandel-methoden.



SUCCES OP LANGE TERMIJN

(genezen en verbeterd)



1. Arya, M., Hamid, R., Sharon, A., & Shah, P. (2002). The treatment of male stress incontinence in neuropathic bladders with polydimethylsiloxane. Proceedings ICS Annual Meeting, Heidelberg, Germany, August 28-30, 230.
2. Hamid, R., Arya, M., Khastgir, J., Patel, H., & Shah, P. (2003). The treatment of male stress urinary incontinence with polydimethylsiloxane in compliant bladders following spinal cord injury. *Spinal Cord*, 41, 286-289.
3. Pinggera, G.M., Furttmüller, B., Rehder, P., Fiala, H.R., Bartsch, G., & Strasser, H. (2003). Submucosale blasenhalsunterspritzung mit Macroplastique® in der behandlung der stressinkontinenz nach radikaler prostatektomie. *Wiener Klin Wochenschrift. Middle Eur J Med*, 115(Suppl 1).
4. Khastgir, J.N., & Shah, P.J.R. (2000). Macroplastique™ injections: How effective is it for stress incontinence in males? Proceedings ICS Annual Meeting, Tampere, Finland, August 28-31.
5. Herschorn, S., & Buencamino, D. (2002). Early results of intraurethral Macroplastique for post radical prostatectomy. *Neuro Urology*, 21(4), 332.
6. Mourad, S. (2003). Long term efficacy of Macroplastique injection for the treatment of urinary incontinence in males and females. *Europ Urol Supplements*, 2(1), 175.
7. Kymälä, T., Tainio, H., Raitanen, M., Teuvo, L.J., & Tammela, T.L. (2003). Treatment of postoperative male urinary incontinence using transurethral Macroplastique injections. *J Endourol*, 17(2), 113-115.

Raadpleeg de bijsluiter bij de Macroplastique-producten of online voor de volledige gebruiksaanwijzing, bewaarinstructies, waarschuwingen, indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, ongewenste voorvallen en garantiebepalingen. Modellen zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Macroplastique is een geregistreerd handelsmerk. Macroplastique wordt geproduceerd door Uroplasty LLC. ©2019 LABORIE. Alle rechten voorbehouden.

EUROPE/INTERNATIONAL:

Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:

Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com