



# Macroplastique®

BEHANDELING VAN VROUWEN  
MET STRESSINCONTINENTIE



# BETROUWBAAR PRODUCT. BETROUWBARE UITKOMSTEN.

Het gebruik van Macroplastique bij de behandeling van stressincontinentie is een eenvoudige procedure zonder de mate van complicaties en herstel van de ingreep waar andere behandelingen mee gepaard gaan. Bij correct gediagnosticeerde en geselecteerde patiënten is deze procedure bij zowel primaire als secundaire indicaties een eenvoudige dagbehandeling.

## MACROPLASTIQUE® URETHRAL BULKING AGENT BEHANDELING VAN VROUWEN MET STRESSINCONTINENTIE

### SUPERIEURE PRESTATIE NA 1 JAAR<sup>1</sup>

In een gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische studie waren de resultaten in de Macroplastique-groep (n=122) aanzienlijk beter dan in de collageencontrolegroep (n=125)

- 80% van de patiënten was droog of aanzienlijk droger dan voorheen (evaluatie door artsen)
- 62% van de patiënten was met ten minste 1 Stamey-graad verbeterd; in vergelijking met de 48% van de collageengroep was dit een statistisch superieur resultaat ( $p < 0,05$ )

### VERBETERDE UITKOMSTEN NA 2 JAAR<sup>2</sup>

In de gerandomiseerde, gecontroleerde trial bleven Macroplastique-patiënten die 2 jaar werden gevolgd (n=84) uitstekende uitkomsten houden

- 75% van de patiënten had een verbetering van ten minste 1 Stamey-graad


### AANHOUDENDE RESULTATEN NA 5 JAAR<sup>3</sup>

- 83.3% succes voor type II
- 80% succes voor type III

1. Ghoniem, G., Corcos, J., Comiter, C., Bernhard, P., Westney, O.L. & Herschorn, S. (2009). Cross-linked polydimethylsiloxane injection for female stress urinary incontinence: Results of a multicenter, randomized, controlled, single-blind study. *JUrol*, 181, 204-210.
2. Uroplasty, Inc. (2006). Macroplastique Premarket Approval Study.
3. Zafirakis, H.G., Nathan, S., & Shah, J. (2002). Long-term efficacy of submucosal urethral injection for genuine stress incontinence in women. AUA abstract, Florida, USA.
4. Ghoniem, G., Bernhard, P., Corcos, J., Comiter, C., Tomera, K., Westney, O., et al. (2005). Multicenter randomized controlled trial to evaluate Macroplastique urethral bulking agent for the treatment of female stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J*, 16 (Suppl 2), S129-S130.
5. Chapple, C., Brubaker, L., Haab, F., Van Kerrebroeck, P., & Robinson, D. (2007). Patient-perceived outcomes in the treatment of stress urinary incontinence: Focus on urethral injection therapy. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*, 18(2), 199-205.

Raadpleeg de bijsluiter bij de Macroplastique-producten of online voor de volledige gebruiksaanwijzing, bewaarinstructies, waarschuwingen, indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, ongewenste voorvallen en garantiebepalingen. Modellen zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Macroplastique is een geregistreerd handelsmerk. Macroplastique wordt geproduceerd door Uroplasty LLC. ©2019 LABORIE. Alle rechten voorbehouden.

*“Macroplastique blijkt een veilige en effectieve behandeling te zijn voor vrouwen met stressincontinentie, waarbij de resultaten zeker twee jaar aanhouden.”<sup>4</sup>*



*“Urethrale injectietherapie blijkt statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbeteringen van de kwaliteit van leven op te leveren. De verbetering van de kwaliteit van leven is feitelijk gelijk aan die bij operatieve behandelingen.”<sup>5</sup>*



EUROPE/INTERNATIONAL:  
Tel.: +31 53 4803700  
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:  
Tel.: +1 905 612 1170  
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com