



Macroplastique®

TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE
URINAIRE D'EFFORT MASCULINE



PRODUIT SÛR. PERFORMANCE PROUVÉE.

MACROPLASTIQUE® BULKING AGENT

Macroplastique est indiqué pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort, qui affecte souvent les hommes après une résection transurétrale de la prostate ou une prostatectomie radicale.

- Innocuité et efficacité démontrées
- Procédure minimal-invasive
- Résultats immédiats

MINIMAL INVASIF


- Nettement moins invasif que les autres traitements possibles
- Atténue immédiatement les symptômes
- Récupération rapide et complications minimales

ÉPROUVÉ

- Des succès cliniques depuis 1991
- Succès à long terme¹⁻⁷
 - Jusqu'à 5 ans de suivi
 - Jusqu'à 80 % de succès mesurés en termes de pertes d'urine (poids des garnitures), de réduction de l'utilisation des garnitures et de perception par le patient des résultats du traitement


ÉCONOMIQUE

Nettement moins coûteux que les autres méthodes de traitement actuelles.



TAUX DE SUCCÈS À LONG TERME

(guérisons et améliorations)



1. Arya, M., Hamid, R., Sharon, A., & Shah, P. (2002). The treatment of male stress incontinence in neuropathic bladders with polydimethylsiloxane. Proceedings ICS Annual Meeting, Heidelberg, Germany, August 28-30, 230.
2. Hamid, R., Arya, M., Khastgir, J., Patel, H., & Shah, P. (2003). The treatment of male stress urinary incontinence with polydimethylsiloxane in compliant bladders following spinal cord injury. *Spinal Cord*, 41, 286-289.
3. Pinggera, G.M., Furthmüller, B., Rehder, P., Fiala, H.R., Bartsch, G., & Strasser, H. (2003). Submucosale blasenhalsunterspritzung mit Macroplastique® in der behandlung der stressinkontinenz nach radikaler prostatektomie. *Wiener Klin Wochenschrift. Middle Eur J Med*, 115(Suppl 1).
4. Khastgir, J.N., & Shah, P.J.R. (2000). Macroplastique™ injections: How effective is it for stress incontinence in males? Proceedings ICS Annual Meeting, Tampere, Finland, August 28-31.
5. Herschorn, S., & Buencamino, D. (2002). Early results of intraurethral Macroplastique for post radical prostatectomy. *Neuro Urology*, 21(4), 332.
6. Mourad, S. (2003). Long term efficacy of Macroplastique injection for the treatment of urinary incontinence in males and females. *Europ Urol Supplements*, 2(1), 175.
7. Kymälä, T., Tainio, H., Raitanen, M., Teuvo, L.J., & Tammela, T.L. (2003). Treatment of postoperative male urinary incontinence using transurethral Macroplastique injections. *J Endourol*, 17(2), 113-115.

Voir la notice accompagnant chaque produit Macroplastique ou consulter www.cogentixmedical.com pour connaître les instructions d'utilisation et de stockage, avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi, réactions indésirables et le refus de garantie. Modèles non contractuels. Macroplastique est une marque déposée. Macroplastique est fabriqué par Uroplasty LLC. ©2019 LABORIE. Tous droits réservés.

EUROPE/INTERNATIONAL:

Tel.: +31 53 4803700
Email: info@laborie.com

HEADQUARTERS:

Tel.: +1 905 612 1170
Email: marketing@laborie.com



www.laborie.com